Study or Subgroup	log[Risk Ratio]	SE	Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI
1.7.1 Females				
Gregory et al. (2013)	0.1655	0.0743	11.5%	1.18 [1.02, 1.36]
Herrera et al. (2017) (2)	0.3264	0.1938	1.9%	1.39 [0.95, 2.03]
Herrera et al. (2017) (3)	0.1519	0.1532	3.0%	1.16 [0.86, 1.57]
Herrera et al. (2017) (4)	0.2515	0.1476	3.2%	1.29 [0.96, 1.72]
Weisman et al. (2015)	-0.0101	0.1282	4.2%	0.99 [0.77, 1.27]
Subtotal (95% CI)			**23.8%**	**1.17 [1.05, 1.30]**
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 2.89, df = 4 (P = 0.58); I² = 0%				
Test for overall effect: Z = 2.97 (P = 0.003)				
1.7.2 Males				
Gale et al. (2003)	-0.0495	0.2147	1.5%	0.95 [0.62, 1.45]
Gregory et al. (2013)	0.1398	0.0464	24.8%	1.15 [1.05, 1.26]
Herrera et al. (2017) (2)	-0.0576	0.0961	7.2%	0.94 [0.78, 1.14]
Herrera et al. (2017) (3)	0.0573	0.0718	12.2%	1.06 [0.92, 1.22]
Herrera et al. (2017) (4)	-0.0151	0.071	12.5%	0.99 [0.86, 1.13]
Weisman et al. (2015)	0.1222	0.0573	17.9%	1.13 [1.01, 1.26]
Subtotal (95% CI)			**76.2%**	**1.07 [1.01, 1.15]**
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 6.51, df = 5 (P = 0.26); I² = 23%				
Test for overall effect: Z = 2.11 (P = 0.03)				
Total (95% CI)			**100.0%**	**1.10 [1.04, 1.16]**
Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 11.07, df = 10 (P = 0.35); I² = 10%				
Test for overall effect: Z = 3.50 (P = 0.0005)				
Test for subgroup differences: Chi² = 1.90, df = 1 (P = 0.17), I² = 47.5%