| Study or Subgroup | log[Risk Ratio] | SE | Weight | Risk Ratio IV, Random, 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| **1.1.1 OT-induction or augmentation** | | | | |
| Al-Ayadhi 2005 | 0.1906 | 0.1567 | 6.8% | 1.21 [0.89, 1.64] |
| Gale et al. (2003) | -0.0495 | 0.2147 | 4.1% | 0.95 [0.62, 1.45] |
| Gregory et al. (2013) | 0.1484 | 0.0412 | 24.5% | 1.16 [1.07, 1.26] |
| Guastella et al. (2018) | -0.4463 | 0.6111 | 0.6% | 0.64 [0.19, 2.12] |
| Herrera et al. (2017) (2) | 0.0188 | 0.086 | 14.9% | 1.02 [0.86, 1.21] |
| Herrera et al. (2017) (3) | 0.0695 | 0.0649 | 19.1% | 1.07 [0.94, 1.22] |
| Herrera et al. (2017) (4) | 0.0344 | 0.0646 | 19.1% | 1.03 [0.91, 1.17] |
| Smallwood et al. (2016) | 0.8416 | 0.2924 | 2.3% | 2.32 [1.31, 4.12] |
| Weisman et al. (2015) | -0.1508 | 0.135 | 8.5% | 0.86 [0.66, 1.12] |
| **Subtotal (95% CI)** | | | **100.0%** | **1.08 [0.98, 1.18]** |
| Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 14.93, df = 8 (P = 0.06); I² = 46% | | | | |
| Test for overall effect: Z = 1.60 (P = 0.11) | | | | |
| **Total (95% CI)** | | | **100.0%** | **1.08 [0.98, 1.18]** |
| Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 14.93, df = 8 (P = 0.06); I² = 46% | | | | |
| Test for overall effect: Z = 1.60 (P = 0.11) | | | | |
| Test for subgroup differences: Not applicable | | | | |