

Tabla 4. Tipos de microfósiles identificados por sitio, según grupo cerámico de los sitios 1 y 5 de la Localidad Tapera Moreira.

Referencias: (X): indica presencia, (-): ausencia.

Microfósiles			STM Sitio 1						STM Sitio 5				
			STM S	STM H	STM 2	STM 4	STM 5	STM 7	STM H	STM U	STM 2	STM 4	STM 5
		<i>Prosopis</i> sp.	X	X	(-)	X	(-)	(-)	X	(-)	(-)	(-)	(-)
Granos de almidón	Simple	<i>Zea mays</i>	X	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		ovoide	X	(-)	X	(-)	(-)	(-)	X	X	X	(-)	(-)
		Con daño	X	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	X	(-)	X	(-)	(-)
Fitolitos	Aislados	Poaceae	X	X	X	X	X	(-)	X	X	X	X	(-)
		Dicotiledóneas	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	X	(-)	X	X	(-)
Restos de hongos			X	(-)	X	X	X	(-)	(-)	X	X	(-)	(-)
Restos orgánicos carbonizados			X	X	X	(-)	(-)	(-)	X	X	X	X	(-)